

# СЕРГОН PG 400+200

## Для полиовуляции и синхронизации охоты свиноматок и ремонтных свинок

В последние несколько лет в промышленном свиноводстве уделяется большое внимание повышению многоплодия и сокращению сервис-периода (СП) у животных. Во многих хозяйствах этот период (от карантина до случки) составляет 30 – 50 дней. Уменьшение этих сроков позволяет увеличить численность поголовья и прибыльность хозяйства. Существует много причин, затягивающих сервис-период:

- удлиненный период между двумя эструсами
- скрытая течка
- задержка наступления половой охоты
- слишком частая поставка ремонтных свинок
- небольшой процент выбраковки.

Сегодня на российском рынке появился препарат, целенаправленно и безопасно решающий эту задачу. **Сергон PG 400+200**, разработанный специально для свинок, даже при однократном введении дает стабильный результат – повышение многоплодия и индукция охоты свиноматок и ремонтных свинок и сокращение сервис-периода.

**Сергон PG 400+200** содержит в своем составе гонадотропин из сыворотки жеребых кобыл (ГСЖК) и человеческий хорионический гонадотропин (ХГЧ). По своим свойствам гонадотропины, входящие в состав препарата, сходны с гормонами свинок – отвечают за рост фолликулов и наступление последующей овуляции.

Безопасность и европейские стандарты качества препарата гарантируются чешской компанией «Биовета», производителем такого известного и популярного препарата как «Эстрофан». При случайном введении супоросным свиноматкам **Сергон PG 400+200** не вызывает абортов.

Препарат не взаимодействует с другими лекарственными средствами и быстро выводится из организма – использование мяса свинок после применения препарата, разрешается уже через 24 часа после его введения.

На данный момент **Сергон PG 400+200** хорошо зарекомендовал себя во многих свиноводческих хозяйствах европейских стран, а сегодня доступен и на российском рынке ветеринарных препаратов!

Препарат применяют однократно внутримышечно в околушную область в дозе 2 мл		
Свиноматкам	Для повышения многоплодия и индукции охоты после отъема	Через 2 дня после отъема
	При анэструсе	На 10 день после отъема
Ремонтным свинкам	При анэструсе	В 8-10 месячном возрасте
	Для индукции эструса	В 5,5 – 6,5 месяцев и/или при достижении живой массы 85-100 кг