

НОВИНКА

# ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР ФЛОРИТИЛ

КОМПЛЕКСНЫЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ  
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА



**МОЩНЫЙ  
ИСТРЕБИТЕЛЬ  
БАКТЕРИЙ!**

- Синергидное действие компонентов против грамположительной, грамотрицательной и смешанной микрофлоры
- Высокая эффективность в отношении бактерий, вырабатывающих ацетилтрансферазы и  $\beta$ -лактамазы
- Активен к наиболее распространенным заболеваниям: бактериозам, микоплазмозам, риккетсиозам, спирохетозам, хламидиозам



100  
мл

Заказывайте у вашего поставщика

Произведено



**НОВИНКА**

# ИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСТВОР ФЛОРИТИЛ

КОМПЛЕКСНЫЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА



**ВПЕРВЫЕ  
МАКРОЛИД +  
ФЕНИКОЛ В  
ИНЪЕКЦИОННОЙ  
ФОРМЕ!**

*Производственные испытания, проведенные в скотоводческих и свиноводческих хозяйствах Ленинградской и Псковской областей, в Мордовской и Чувашской республиках, подтверждают:*

- исчезновение клинических признаков на 2-3 день лечения
- высокий уровень сохранности
- сокращение сроков достижения высоких среднесуточных привесов

## СОСТАВ

В 1 мл содержится: Флорфеникола – 100 мг; Тилозина тартрата – 50 мг.

## ПОКАЗАНИЯ

Лечение у свиней и крупного рогатого скота заболеваний бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к флорфениколу и тилозину тартрату, в том числе:

- инфекций органов дыхания у свиней, в т. ч. легочного пастереллеза, плевропневмонии свиней, актинобациллезной плевропневмонии свиней (АПП), энзоотической плевропневмонии свиней, микоплазмоза, атрофического ринита свиней;
- инфекций органов дыхания у крупного рогатого скота, вызванных *Streptococcus spp.*, *Pasteurella spp.*, а также инфекций, вызванных *Klebsiella pneumoniae*, *Haemophilus somnus*, *Bordetella bronchiseptica*, *Mycoplasma spp.*, *Rickettsia spp.*;
- некробактериоза крупного рогатого скота, вызванного *Fusobacterium necrophorum*;
- инфекционного кератоконъюнктивита у крупного рогатого скота, вызванного *Moraxella bovis*;
- стафилококкоза;
- кожных заболеваний;
- вторичных бактериальных инфекций, вызванных микроорганизмами чувствительными к компонентам препарата.

## ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат Флоритил вводят сельскохозяйственным животным внутримышечно 1 раз в сутки в дозе 1 мл на 10 кг живой массы. Мелким домашним животным – внутримышечно или подкожно 1 раз в сутки в дозе 1 мл на 10 кг живой массы. Курс лечения составляет 3-5 суток.



Внешний вид упаковки препарата может отличаться от изображения

Заказывайте у вашего поставщика

Произведено

